

Профілактика туберкульозу

Туберкульоз — інфекційне захворювання людини, тварин, яке викликається бактерією туберкульозу (**паличкою Коха**).

У світі спостерігається значне відновлення туберкульозу у 2022р, пов'язаний з COVID-19.


У 2022 році у світі туберкульоз спричинив приблизно **1300000 смертей**.

В Україні 2023р. на туберкульоз захворіли майже 20000 осіб.



Туберкульозом захворіти може кожен!


Збудник вражає всі органи і системи організму.



ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ - хвора людина (на відкриту бактеріальну форму туберкульозу - коли хвора людина виділяє мікобактерію у довкілля), 55 видів тварин, 25 видів туберкульозу птахів, а також заражені продукти тваринного і рослинного походження.

Шляхи передачі туберкульозу:

- повітряно- крапельним
- харчовим



ОСНОВНІ СИМПТОМИ ЗАХВОРЮВАННЯ:

Кашель понад 2 тижні

Утруднене дихання

Біль у грудях

Поганий апетит

Безпричинна втрата ваги

Підвищення пітливість



На ранніх стадіях хвороби кашель може бути відсутній. Усі ці симптоми можуть бути проявами інших захворювань, але перш за все треба думати про туберкульоз. Коли туберкульозні бактерії потрапляють в організм людини з нормальним станом імунітету, активне захворювання найчастіше не розвивається.

Людина інфікована, але здорова!



Найбільшу вірогідність захворіти має людина, у якої знижений, слабкий імунітет.


Високий ризик захворіти мають:

- діти, особливо раннього віку (їх імунна система ще не сформована)
- люди похилого віку (через вікове ослаблення імунітету).



ТУБЕРКУЛЬОЗ ВИЛКОВНИЙ! при умові раннього виявлення, ефективного лікування та дотримання рекомендацій лікаря.

ТУБЕРКУЛЬОЗ НЕ ВИЛКОВУЄТЬСЯ при перериванні лікування, зловживанні алкоголю, хаотичному вживанні протитуберкульозних препаратів.



Інфіковані
легені



Кровотеча
з тканини



ПАМ'ЯТАЙТЕ:

1. Неповноцінне харчування, шкідливі звички можуть провокувати послаблення імунітету.
2. Систематичні заняття фізичними вправами. загартування, проведення більше часу на свіжому повітрі не дають змоги туберкульозу зіпсувати Ваше здоров'я.
3. Якщо більше 2 тижнів почувастеся погано та маєте вище зазначені симптоми негайно зверніться до СВОГО сімейного лікаря.
4. Своєчасно виявлений хворий, що отримує повноцінне лікування, через 4 тижні не є джерелом інфекції. **Категорично забороняється переривати лікування !** При порушенні режиму лікування хвороба переходить у хронічну форму, яку вилікувати дуже важко.

ВАЖЛИВА ВЧАСНА
ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ



ПАМ'ЯТАЙТЕ:

5. Навіть коли людина почуває себе добре, варто один раз на два роки звернутись до сімейного лікаря з профілактичною метою.
6. Уникайте покупок продуктів тваринництва, які не пройшли ветеринарного обстеження (особливо на стихійних ринках).
7. Строго дотримуйтесь правил особистої гігієни при використанні молока і м'яса, надійно термічно їх обробляйте. Не купляйте молочні продукти, фасовані у нестерильний, раніше вживаний пластиковий посуд.

ТУБЕРКУЛЬОЗ ВИЛІКОВНИЙ




Туберкульоз — це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.

У більшості випадків уражає легені. Але може ушкодити нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли чи статеві органи.



ЯКЩО ХВОРИЙ ВДОМА

1. Хворий на туберкульоз може стати джерелом захворювання своїх рідних, особливо дітей.
2. Особам, що проживають разом з хворим треба негайно звернутись до сімейного лікаря.
3. Якщо хворий не госпіталізований:
виділити окрему кімнату або окремий куток і відгородити ширмою;
обов'язково ізолювати дітей від хворого;
хворий туберкульозом під час кашлю повинен прикривати рот і ніс серветкою, що значно зменшить кількість інфекційних краплин, які потрапляють у повітря,;
4. Особливу увагу звертайте на дотриманням хворим та рідними правил особистої гігієни.



В Україні змінили схему безкоштовного
лікування туберкульозу



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!